

FINALIDADE:

Verificação do funcionamento do laringoscópio diariamente.

JUSTIFICATIVA:

Garantir a limpeza e desinfecção de cabos e lâminas de laringoscópio após cada uso.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

Remover sujidades;

Reducir carga microbiana;

Prevenir infecções relacionadas a assistência à saúde;

Testar funcionalidade.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

Enfermeiro/Técnico de Enfermagem/Auxiliar de Enfermagem.

MATERIAL NECESSÁRIO:

Para teste:

- Luvas de procedimento;
- Lâmina e cabo do laringoscópio;
- 2 pilhas médias comuns.

Para limpeza e desinfecção:

- EPIs (luvas de procedimento, óculos e máscara);
- Água;
- Sabão;
- Álcool a 70%;
- Gaze estéril.

PROCEDIMENTO:

Profissional	Descrição
ENFERMEIRO	<p>TESTE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienize as mãos;2. Calce as luvas de procedimento;3. Verifique a presença das duas peças do laringoscópio (lâmina e cabo);4. Coloque as pilhas no compartimento do cabo, certificando de que estão do lado correto e feche a tampa;5. Encaixe firmemente a lâmina do laringoscópio ao cabo de pé;6. Puxe a lâmina para cima encaixando-a;7. Certifique que a luz que está na lâmina acenda ao encaixá-la no cabo;8. Após confirmar o funcionamento, desencaixe as duas partes;9. Teste com todas as lâminas;

TÉCNICO DE ENFERMAGEM AUXILIAR DE ENFERMAGEM	<ol style="list-style-type: none"> 10. Guarde-as junto ao equipamento de intubação traqueal; 11. Retire as luvas de procedimento; 12. Higienize as mãos; <p>LIMPEZA E DESINFECÇÃO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Higienize as mãos; 2. Coloque óculos, máscara e calce as luvas de procedimento; 3. Desmonte todo o conjunto do laringoscópio e retire as pilhas; 4. Limpe o cabo do laringoscópio com gaze umedecida em água e sabão; 5. Remova o sabão com gaze umedecida em água; 6. Seque o cabo com gaze seca; 7. Friccione com álcool a 70% no cabo por 20 a 30 segundos; 8. Limpe a lâmina do laringoscópio com gaze umedecida em água e sabão; 9. Enxágue abundantemente com água corrente; 10. Seque a lâmina com gaze seca sem deixar umidade ao redor da lâmpada; 11. Umedeça uma gaze com álcool a 70% e fricione na lâmina por 20 a 30 segundos; 12. Monte o laringoscópio, teste o seu funcionamento e certifique-se que não há sujidade ou umidade; 13. Guarde o laringoscópio protegido em saco plástico no local correto do carrinho de emergência; 14. Retire as luvas, óculos e máscara e descarte os resíduos em local apropriado; 15. Higienize as mãos.
---	--

OBSERVAÇÕES

- Sempre deixar duas pilhas novas de reserva no carro de emergência;
- Este material deve ter seu funcionamento testado em cada plantão pelos profissionais de enfermagem;
- Durante o teste de funcionamento do laringoscópio, se a luz não acender, confira o contato e/ou troque as pilhas do cabo. Se o problema persistir, encaminhe à Engenharia Clínica para conserto e comunique à chefia do setor;
- O registro do teste de funcionamento do laringoscópio deverá ser registrado na Planilha de materiais de emergência;
- Deve-se fazer a limpeza e desinfecção do laringoscópio a cada uso do mesmo;
- O laringoscópio não pode ser deixado imerso em soluções;
- O procedimento de limpeza e desinfecção do laringoscópio deve ser realizado no expurgo;
- O registro da limpeza do laringoscópio deve ser feito na Planilha de materiais de emergência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

1. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Manual de Limpeza e Desinfecção da ANVISA, 2010.
2. Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Manual de Limpeza, Desinfecção e Esterilização em Unidades de Saúde. 2006.
3. ANVISA. Orientações para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, 2009.

HISTÓRICO DE REVISÕES:

20/02/2024 - Atualizado e revisado